

Los Condones Femeninos

ATRIBUTOS DE LOS CONDONES FEMENINOS

- Los condones femeninos son el único producto disponible para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) diseñado para que las mujeres tomen la iniciativa de su uso.
- Los productos disponibles están hechos de plástico blando, caucho o látex y se mantienen en su sitio con un anillo de plástico o una esponja
- El único condón femenino aprobado por la Dirección de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, conocido como el "FC1" por su nombre en inglés, está hecho de poliuretano lo cual significa que puede usarse tanto con lubricantes con base de agua o aceite, y que pueden usarlo las personas alérgicas al látex.

EL CONDÓN FEMENINO ES UN MÉTODO ALTAMENTE EFICAZ PARA PREVENIR LA INFECCIÓN CON VIH Y EL EMBARAZO

- Los estudios han mostrado que el condón femenino es, por lo menos, tan eficaz como el condón masculino para la reducción del riesgo de contraer infecciones transmitidas sexualmente (ITSs)¹ y que puede reducir la probabilidad de transmisión por coito del VIH en un 97%.²
- El uso común de los condones femeninos evitará el embarazo en 70 de 100 mujeres que usen el producto en el primer año³. El uso correcto y constante resulta en la prevención de 95 de cada 100 embarazos en el primer año. El uso común de los condones masculinos evitará 85 de cada 100 embarazos en el primer año y 98 de cada 100 embarazos si se usa de forma correcta y consistente⁴.

EL CONDÓN FEMENINO TIENE ELEVADAS TASAS DE ACEPTACIÓN

- La investigación realizada en más de 40 países demuestra la aceptación del condón femenino entre hombres y mujeres de varias edades, diferentes status socioeconómicos, orientación sexual y ubicación geográfica, con tasas de hasta el 96%.⁵

- Los estudios han mostrado que los condones femeninos se usan a menudo cuando uno o ambos miembros de la pareja se rehúsa a emplear el condón masculino⁶.
- Algunas mujeres y hombres encuentran que el placer sexual con el condón femenino es superior al del condón masculino⁷.

EL ACCESO A LOS CONDONES FEMENINOS AUMENTA EL NÚMERO DE ACTOS SEXUALES PROTEGIDOS

- Estudios en Madagascar, Kenia, India y Brasil han mostrado que la promoción del condón femenino y su uso aumentan el número total de actos sexuales protegidos y esto reduce las tasas de enfermedades venéreas y el riesgo de infección con el VIH⁸.
- Los condones femeninos proporcionan una opción adicional de protección en el coito anal, el comportamiento sexual con la probabilidad más alta de transmisión del VIH.

LOS CONDONES FEMENINOS CONTINÚAN, EN GRAN MEDIDA, SIENDO INACCESIBLES

- En 2007 se distribuyeron en todo el mundo casi 26 millones de condones femeninos comparado con 11 mil millones de condones masculinos⁹.
- Los condones femeninos representan apenas el 0,2% del suministro total de condones en el mundo¹⁰.
- El gobierno de Estados Unidos ha enviado condones femeninos a 30 países desde 1996 y a 16 países en 2007. Sólo cinco países selectos de PEPFAR (el *Plan de Emergencia del Presidente – de los EE.UU.*] para la Cooperación hacia el SIDA) han recibido condones femeninos obtenidos en Estados Unidos¹¹.
- Los condones femeninos son apenas el 1,6% de todos los envíos internacionales de condones desde EE.UU.¹²

REFERENCIAS

- ¹ UNFPA and PATH. 2006. *Female Condom: A Powerful Tool for Protection*. New York: United Nations Population Fund.
- ² Trusell, J, K. Sturgen, J. Strickler and R. Dominik. 1994. Comparative Contraceptive Efficacy of the Female Condom and Other Barrier Methods. *Family Planning Perspectives* 26: 66-72 as cited in Ebin, V. S. et al. 2006. In our Own Hands: SWAA-Ghana Champions the Female Condom. *Quality/Caldida/Quatlie* (17). New York: Population Council, Inc.
- ³ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHBSPH), U.S. Agency for International Development (USAID) and World Health Organization (WHO). 2007. *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. Baltimore, MD.: INFO Project.
- ⁴ Ibid fn. 4
- ⁵ UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research on Human Reproduction. *The Female Condom: A Review*. Geneva: World Health Organization, 1997; Cecil H, Perry MH, Seal DW, et al. The female condom: what we have learned thus far. *AIDS and Behavior* 1998;2(3):241-56.
- ⁶ Agha, S. 2001. Intention to Use the Female Condom Following a Mass-Marketing Campaign in Lusaka, Zambia. *American Journal of Public Health* 91(2): 307-310.
- ⁷ Dias, P., K. Souto and K. Page-Shafer. 2006. Long Term Female Condom Use among Vulnerable Populations in Brazil. *AIDS and Behavior* 10 (1): 71.
- ⁸ Center for Health and Gender Equity. 2008. *Saving Lives Now: Female Condoms and the Role of U.S. Foreign Aid*. Takoma Park, MD: Center for Health and Gender Equity.
- ⁹ Ibid fn. 8
- ¹⁰ Ibid fn. 8
- ¹¹ NEWVERN. 2008. NEWVERN is the information system for the Central Contraceptive Procurement (CCP) team of the GH/PRH/CSL Division of USAID. Arlington, VA: John Snow, Inc.
- ¹² Ibid fn. 11